INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS AL PACIENTE



Lacasa C, Guardino M, Estorch L, Romero I, Santillana M.

Servicio de Farmacia. Hospital de Barcelona. farmacia@sciashdb.com

OBJETIVO

Diseño y puesta en marcha de una nueva aplicación informática (Farmafacil®) para proporcionar una información individualizada a pacientes con riesgo de incumplimiento sobre su tratamiento farmacológico. Permite la libre incorporación de nuevos medicamentos a la base de datos. En nuestro país sólo existe otra aplicación con una utilidad parecida pero su coste es elevado.

MÉTODOS

- **Base de datos.** FileMaker Pro 4.0: Paciente, nombre y especialidad del médico y farmacéutico que prepara la información.

- **Información farmacoterapia.** Código nacional, nombre genérico y registrado, forma farmacéutica, dosis, acción principal e indicaciones, recomendaciones y efectos adversos.

- **Control de calidad para la entrada de datos.** Doble firma.



INFORMACIÓN TOMA DE MEDICAMENTOS

Paciente: AAAA BBBBBB — 26 de agosto de 2009


HORAS 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

OMEPRAZOL ALTER CÁPSULAS 20 MG — una cápsula — cena — Oral

DOXAZOSINA ALTER COMPRIMIDOS 2 MG — Un comprimido — cada 12 horas — Oral

CEFUROXIMA RATIOPHARM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 MG — 1 comp — cada 12 horas — Oral

Horario formato horizontal



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Paciente: AAAA BBBBBB — Miércoles 26 de Agosto de 2009

OMEPRAZOL ALTER CÁPSULAS 20 MG

¿Para qué se utiliza? Medicamento que cura para disminuir la acidez del estómago y curar la úlcera digestiva.

Recomendaciones: Si sufre de úlcera leve. Puede producir estreñimiento.

Efectos secundarios: Aunque no es frecuente que los produzca, algunas veces pueden presentarse dolor de cabeza, diarrea, náuseas, dolor abdominal, mareo. Si sufre efectos son persistentes consulte a su médico. Puede aumentar el riesgo de algunas fracturas (osteoporosis) y artritis.

DOXAZOSINA ALTER COMPRIMIDOS 2 MG

¿Para qué se utiliza?: Medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión arterial.

Recomendaciones: Tome este medicamento incluso si se siente bien. Si toma este medicamento por la noche tenga mucho cuidado si tiene que levantarse durante la noche. No tome ningún medicamento para la tos, resfriados o alergias sin consultar antes a su médico o farmacéutico. Antes de una cirugía, incluso dental, informe que está tomando este medicamento. Limite el consumo de alcohol y evite el exceso de calor. No conduzca ni maneje maquinaria peligrosa hasta saber como le sienta el medicamento.

Efectos secundarios: Este medicamento puede producir dolor de cabeza, mareos y somnolencia. También pueden producirse molestias intestinales, taquicardias, sarpullidos, visión borrosa y dolor.

Informe resumido de cada medicamento

RESULTADOS

Julio 1999-Marzo 2009:

- 1.300 fichas de medicamentos

-345 informes entregados a pacientes (media de cinco medicamentos/informe)

-Mejora y actualización constante del programa para poder utilizarlo en otras farmacias y hospitales

Esquema de dosis variables



Paciente: AAAA BBBBBB

DACORTIN 30 COMPRIMIDOS 30 MG — variable comprimido/día — desayuno

26/08 30 MG | 27/08 30 MG | 28/08 20 MG | 29/08 20 MG | 30/08 10 MG | 31/08 10 MG



CONCLUSIONES

-Tanto el programa como la base de datos de información de medicamentos han sido útiles y cumplen el objetivo para el que se diseñaron.

-El precio de este nuevo producto posibilita una amplia difusión del programa que seguro que contribuirá a una continua mejora.

54 CONGRESO SEFH — FARMACIA HOSPITALARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE