ERRORES DE MEDICACIÓN

Alerta sobre errores de medicación

Los cuatro riesgos de mayor importancia a los que está sometido un paciente cuando ingresa en un hospital son, por este orden, los siguientes:

— Errores de medicación.

— Infección nosocomial.

— Úlceras por presión.

— Tromboembolismo.

El farmacéutico de hospital puede ayudar a la prevención de todos ellos por sus conocimientos y por la especial situación que ocupa como facultativo de un servicio central.

Sin embargo, la prevención de los errores de medicación le implica de forma específica, como profesional del medicamento y técnico que debe garantizar la calidad de los procesos de utilización de medicamentos en el hospital. Las causas de los errores de medicación pueden ser responsabilidad de las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica, la organización de los hospitales, los médicos, los farmacéuticos, las enfermeras y los propios pacientes o sus familiares.

El objetivo de esta nota en el Boletín Informativo de nuestra Sociedad Científica es la difusión de información y la alerta a los farmacéuticos de hospital sobre errores de medicación producidos y sus causas para evitarlas.

ERRORES DE MEDICACIÓN POR DISEÑO SIMILAR DE FORMAS FARMACÉUTICAS

Esta primera alerta quiere incidir en causas de errores producidos en nuestros hospitales que la industria farmacéutica puede ayudar a evitar. Es frecuente que los laboratorios farmacéuticos den prioridad en el diseño de los envases y formas farmacéuticas a la imagen de marca más que a la seguridad en la utilización de los medicamentos.

Así sugerimos a los fabricantes de medicamentos, que indicamos a continuación, los siguientes cambios:

— *Ciba-Geigy.* Modifique las etiquetas de las ampollas de Voltaren® y Anafranil® (son muy parecidas de color amarillo y blanco).

— *Boehringer Mannheim y Boehringer Ingelheim.* Diferencien las ampollas de Digoxina® y Buscapina® (ambas son de vidrio topacio y parecida serigrafía).

— *Smith Kline French.* Cambie uno de los colores de los sobres de Augmentine® de 500-125 y 250-62,5 mg (ambos son de un color violeta muy parecido).

— *Synthelabo Delagrange y Rhône-Poulenc-Rorer.* Diferencien las ampollas de Primperan® y Frinova® (ambas de vidrio transparente y serigrafiadas en azul).

Al hacerlo ayudarán a prevenir errores de medicación con estos medicamentos en los pacientes ingresados en nuestros hospitales.

Dra. Carmen Lacasa
Vocal de Cataluña y Baleares de la SEFH.
Servicio de Farmacia. Hospital de Barcelona